



すえなが新聞

2009.9月号 vol.35

〒852-8003

長崎市旭町6-1タワーコート3F

TEL 095-834-1188


治したのにナゼ悪くなるの!?

二次う蝕(二次カリエス)というのをご存知ですか?

これは、一度むし歯の治療(詰めものやかぶせもの)をした後に再びむし歯になってしまう事をいいます。

以前治療した所が痛い、しみるという症状がある方はもしかすると二次う蝕の可能性があるかもしれません。

治療した歯はむし歯になりやすい!!



一度治療した歯は二度とむし歯にはならないと思っている方がいらっしゃいますが何も手を加えていない健康な歯に比べると、結構高い確率で再びむし歯になってしまうと言ってもいいかもしれません。

Why?



歯と言詰めもの(かぶせもの)の



境界部からむし歯に!!



*歯科用水銀アマルガムとは...
歯科治療の際に詰める材料ですが近年使用量は減少しています。
辺縁が欠けやすく形が変形しやすいのも特徴です。

- ★ セメント及びかぶせもの等の劣化
- ★ 歯科用水銀アマルガムの使用
- ★ 歯ぎしりやくいしばりによる詰めものが変形・破損

治療したから大丈夫!は大間違い!!

詰めものやかぶせものをした後は内部の状態が外から診ただけではむし歯の有無がわかりづらい場合もあります。

気付いた時には歯の内部がむし歯になっているという事も...

再発防止の為に、毎日のホームケアを丁寧にやる事はもちろんですが、定期的に歯科医院での専門的なメンテナンスを受ける事が大事です。